



Centrum Cytologii i Patomorfologii

ul. Swobodna 8 (róg Królewskiej) 41-209 Sosnowiec czynne pn-pt: 9.00-16.00

tel./fax: 32 299 71 45 tel. kom.: 602 232 466 rejestracja telefoniczna sekretariat@cyto-pato.pl

www.immunomed.pl



Badania zlecone w celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia

NAZWISKO

IMIĘ

PESEL lub nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość DATA URODZENIA

ADRES TELEFON

Nr materiału:\* DATA POBRANIA

Dzień cyklu/dł. cyklu\* Data ostatniej miesiączki\* Ilość porodów:\*

\* POLA ZAZNACZONE GWIAZDKĄ - WYMAGANE WYPEŁNIENIE.

SKIEROWANIE NA BADANIA CYTOLOGICZNE - CYTOLOGIA PŁYNNY LBC

- Topograia pobrania: sklepienie, tarcza, kanał szyjki, inne

PRAWIDOWY SPOSÓB ZAZNACZANIA BADAŃ

Rozpoznanie/Dane kliniczne:

SKIEROWANIE NA HPV test PCR

HPV test PCR

Forma do zaznaczenia HPV test PCR

(detekcja 38 typów HPV + genotypowanie HPV: 16, 18, 6, 11, 31, 33)

PIECZĄTKA / PODPIS LEKARZA



Centrum Cytologii i Patomorfologii

ul. Swobodna 8 (róg Królewskiej) 41-209 Sosnowiec czynne pn-pt: 9.00-16.00

tel./fax: 32 299 71 45 tel. kom.: 602 232 466 rejestracja telefoniczna sekretariat@cyto-pato.pl

www.immunomed.pl



Badania zlecone w celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia

NAZWISKO

IMIĘ

PESEL lub nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość DATA URODZENIA

ADRES TELEFON

Nr materiału:\* DATA POBRANIA

Dzień cyklu/dł. cyklu\* Data ostatniej miesiączki\* Ilość porodów:\*

\* POLA ZAZNACZONE GWIAZDKĄ - WYMAGANE WYPEŁNIENIE.

SKIEROWANIE NA BADANIA CYTOLOGICZNE - CYTOLOGIA PŁYNNY LBC

- Topograia pobrania: sklepienie, tarcza, kanał szyjki, inne

PRAWIDOWY SPOSÓB ZAZNACZANIA BADAŃ

Rozpoznanie/Dane kliniczne:

SKIEROWANIE NA HPV test PCR

HPV test PCR

Forma do zaznaczenia HPV test PCR

(detekcja 38 typów HPV + genotypowanie HPV: 16, 18, 6, 11, 31, 33)

PIECZĄTKA / PODPIS LEKARZA

## PRZYGOTOWANIE PACJENTKI DO BADANIA CYTOLOGICZNEGO:

1. Badanie wykonuje się pomiędzy 10-20 dniem cyklu miesiączkowego (można je wykonać praktycznie każdego dnia poza miesiączką, ale nie wcześniej niż 2 dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później niż 2 dni przed jej rozpoczęciem).
1. Do higieny intymnej należy używać płynów o kwaśnym pH, gdyż mydło posiada silny zasadowy odczyn, co może zmieniać fizjologiczną florę bakteryjną pochwy.
2. Nie należy wykonywać irygacji przed badaniem, ani nie zakładać tamponów.
3. Leki dopochwowe należy odstawić na 6 dni przed wykonaniem badania.
4. Przerwa od stosunku płciowego powinna wynosić co najmniej 24 godziny.
5. Odczekać co najmniej 24 godziny po badaniu ginekologicznym, czy badaniu USG dopochwowym.

## JAK POSTĘPOWAĆ Z MATERIAŁEM DO BADANIA

### Cytologia ginekologiczna - LBC zawiesina komórek

1. Wymaz pobierać za pomocą szczoteczki
2. Wprowadzić włosie środkowej części główki szczoteczki do kanału szyjki macicy na taką głębokość, aby krótsze włosie dotknęło tarczy części pochwowej szyjki macicy, utrzymując nacisk obracać szczoteczkę pięciokrotnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Ostrożnie wyciągać szczoteczkę (uważać, by włosiem szczoteczki nie dotknąć zewnętrznej powierzchni probówki lub żadnego innego przedmiotu).
4. Odkręcić pojemnik i natychmiast umieścić w nim szczoteczkę w taki sposób, by włosie było zanurzone w buforze, przycisnąć 10x do dna pojemnika, aby włoski uległy rozdzielaniu następnie odłamać główkę szczoteczki i zostawić w pojemniczku.
5. Zamknąć szczelnie pojemnik, tak aby linia gwintu na butelce pokrywała się z linią gwintu na zakrętce.
6. Pojemnik opisać imieniem i nazwiskiem.

## PRZYGOTOWANIE PACJENTKI DO BADANIA CYTOLOGICZNEGO:

1. Badanie wykonuje się pomiędzy 10-20 dniem cyklu miesiączkowego (można je wykonać praktycznie każdego dnia poza miesiączką, ale nie wcześniej niż 2 dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później niż 2 dni przed jej rozpoczęciem).
1. Do higieny intymnej należy używać płynów o kwaśnym pH, gdyż mydło posiada silny zasadowy odczyn, co może zmieniać fizjologiczną florę bakteryjną pochwy.
2. Nie należy wykonywać irygacji przed badaniem, ani nie zakładać tamponów.
3. Leki dopochwowe należy odstawić na 6 dni przed wykonaniem badania.
4. Przerwa od stosunku płciowego powinna wynosić co najmniej 24 godziny.
5. Odczekać co najmniej 24 godziny po badaniu ginekologicznym, czy badaniu USG dopochwowym.

## JAK POSTĘPOWAĆ Z MATERIAŁEM DO BADANIA

### Cytologia ginekologiczna - LBC zawiesina komórek

1. Wymaz pobierać za pomocą szczoteczki
2. Wprowadzić włosie środkowej części główki szczoteczki do kanału szyjki macicy na taką głębokość, aby krótsze włosie dotknęło tarczy części pochwowej szyjki macicy, utrzymując nacisk obracać szczoteczkę pięciokrotnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Ostrożnie wyciągać szczoteczkę (uważać, by włosiem szczoteczki nie dotknąć zewnętrznej powierzchni probówki lub żadnego innego przedmiotu).
4. Odkręcić pojemnik i natychmiast umieścić w nim szczoteczkę w taki sposób, by włosie było zanurzone w buforze, przycisnąć 10x do dna pojemnika, aby włoski uległy rozdzielaniu następnie odłamać główkę szczoteczki i zostawić w pojemniczku.
5. Zamknąć szczelnie pojemnik, tak aby linia gwintu na butelce pokrywała się z linią gwintu na zakrętce.
6. Pojemnik opisać imieniem i nazwiskiem.